Rijn en Gouwe Wiericke

Weidevogelmonitoring voorjaar 2026



Boer en natuur, ze horen bij elkaar. Sterker nog: de boer kan niet zonder natuur en sommige dier- en plantensoorten zijn hier dankzij de boer.
Veel boeren dragen dan ook extra zorg voor 'hun' boerenland-natuur door samen met een collectief zoals Rijn en Gouwe Wiericke afspraken te maken over de bescherming van het leefgebied van bijvoorbeeld de grutto, de kievit, de tureluur en de scholekster. Ieder op de manier die binnen het bedrijf haalbaar is.
Deze korte rapportage belicht vooral of de beheermozaïeken ook voor de weidevogels 'haalbaar' waren en er dus voldoende kuikens groot werden. Zoals altijd verschilt dat per gebied, maar ook per soort. In deze rapportage wordt een overzicht van ongeveer eenderde van de RGW gebieden geschetst: de gebieden die dit voorjaar zijn gemonitord.





ARJAN VAN DUIJVENBODEN | KERKSTRAAT 53 | 2223 AG KATWIJK
0644810372 | ARJAN@DNATUUR.NL | WWW.DNATUUR.NL

DUIJVENBODEN NATUUR
FOTOGRAFIE ADVIES ONDERZOEK

HET GEBIED

De in 2026 geïnventariseerde gebieden zijn zichtbaar in afb. 1. Het landschap is vaak open met ten noorden van de Oude Rijn vaak grote polders en verder naar het zuiden iets meer besloten landschappen. De Agrarische bedrijven zijn meestal gemiddeld van grootte, er zijn weinig grote bedrijven. Water is overal ruim aanwezig, sommige percelen kennen maar een paar decimeter ontwatering.



Afb. 1: de in 2026 getelde gebieden (geel), met beheerpakketten (gekleurde vlakjes)

BEHEER 2026

Het behoud en de ontwikkeling van de populaties weidevogels staat of valt met juist uitgevoerd agrarisch beheer. Weidevogels in Nederland zijn cultuurvolgers: ze hebben het agrarisch land geadopteerd als broedgebied. En veel boeren hebben de vogels geaccepteerd op het land en in de bedrijfsvoering, door met het collectief afspraken te maken over aangepast beheer van gras- en maisland.

		De Wijk	Groendijk	Hoog- en laageind	Hornpolder	Middelburg midden	Middelburg noord	Middelburg zuid	Middenpolder oost	Venster Bodegraven	Venster Nieuwebrug	Venster tussen wiericke	Zuideinder-polder	Totaal Resultaat
Pakketcode	**Omschrijving//oppervlakte gebied (ha.)**	**94,0**	**139,0**	**535,0**	**110,0**	**79,0**	**96,0**	**82,0**	**33,0**	**142,0**	**103,0**	**160,0**	**666,0**	**2239,0**
A01a	van 1 april tot 1 juni	2,5	5,2	8,8			2,6						3,5	**22,6**
A01b	van 1 april tot 8 juni	2,0	1,9	2,6		1,1							2,2	**9,7**
A01c	van 1 april tot 15 juni			9,3	0,6			3,9					0,0	**13,8**
A01d	van 1 april tot 22 juni	0,7		0,0									0,0	**0,7**
A01l	voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 15 juni			0,0								0,9	0,0	**0,9**
A01q	voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 1 juni			2,0									2,0	**4,0**
A01r	voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni	2,4		0,0	1,0		0,9	1,1					2,4	**7,8**
A01s	voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni			0,0				2,0					0,0	**2,0**
A01u	voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni			0,0	2,7								0,0	**2,7**
A03a	van 15 februari tot 15 april	0,2	0,0	1,5	0,3	0,2		0,1					0,0	**2,3**
A03b	van 15 februari tot 15 mei			0,0								0,2	0,0	**0,2**
A03c	van 15 februari tot 15 juni	0,1		0,0									0,0	**0,1**
A03i	in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken	0,3	0,4	0,0			0,2	0,1				0,1	0,8	**1,8**
A03j	in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken			0,0									1,0	**1,0**
A03k	in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken			0,0								0,2	0,0	**0,2**
A04a	legselbeheer op grasland	13,9	37,0	130,6	22,1	17,0	45,6	36,8	11,8	53,4	26,4	39,2	282,3	**716,2**
A04d	plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus			4,4	2,3	0,7							4,7	**12,1**
A04e	plus 3 weken rust in de periode van 23 april tot 1 augustus			0,0		2,1	0,5						4,2	**6,8**
A04f	plus 4 weken rust in de periode van 23 april tot 1 augustus	1,9		7,3		1,8		4,1					4,7	**19,9**
A04g	plus 5 weken rust in de periode van 23 april tot 1 augustus	7,6	1,0	0,0		6,0							15,2	**29,8**
A04h	plus 6 weken rust in de periode van 23 april tot 1 augustus	17,7		0,0		3,1							0,0	**20,9**
A05a	rust 1 april tot 15 juni, 4 indicatorsoorten	3,0	1,0	7,4	4,5								10,4	**26,3**
A05b	rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten			0,0		1,3							0,0	**1,3**
A05c	rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten			0,0								0,5	0,0	**0,5**
A06a	beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha.			0,0									10,1	**10,1**
A06c	beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha			0,0		3,7							1,0	**4,8**
A07a	ruige mest	18,0	8,0	27,1	13,7	19,4	1,0	12,1				6,8	164,5	**270,7**
A13a	botanisch weiland (4 indicatorsoorten)			0,0									2,6	**2,6**
A13c	botanisch waardevolle weiderand geen maaibeperking (4 indicatorsoorten)	0,1	0,1	2,3		0,1		0,3			0,4		2,0	**5,4**
A13c.27.01	RGW botanische weiderand met maaibeperking tot 1 juni.	0,7	1,4	9,3		0,1		0,9		1,7	0,7		0,0	**14,8**
A42a	legselbeheer op bouwland			7,1	4,7					2,3		12,7	3,9	**30,7**
Totaal Resultaat (incl ruige mest en Last-minute)		**71,0**	**56,0**	**220,7**	**52,0**	**56,8**	**50,8**	**61,4**	**11,8**	**57,5**	**27,6**	**60,6**	**517,6**	**1243,9**

Afb. 2: Alle ANLB in cijfers

In afb. 2 zijn de in de telgebieden van 2026 afgesloten beheerpakketten zichtbaar (oppervlakten in ha.). Van de 2240 ha. telgebied in 2026 werd ongeveer 900ha. voor weidevogels beheerd.

Op het grootste beheerdeel, 750 ha, werden legsels beschermd. Op 230 ha. daarvan werd Last- minute kuikenland toegepast en op 275 ha. werd ruige mest gestrooid. Naast de Last-minute pakketten waren er op 140 ha. kuikenland-pakketten.

In de telgebieden 2026 was van de totale 2239ha. bijna 1360ha. 'wit gebied', dus zonder enige afspraak over weidevogelbeheer.

Later in dit rapport worden deze cijfers gekoppeld met de biotoopwensen van de weidevogels.



Monitoring van boerenlandvogels

De telgebieden zijn gemonitord met behulp van de zogenaamde BTS- of Mozaïekscan methode. Bij deze methode worden de weidevogels van het gebied eerst met behulp van verrekijker, telescoop en gehoor digitaal in kaart gebracht op de website Boerenlandvogelmonitor.nl (toegang tot deze gegevens kan alleen via een door bijvoorbeeld personeel van het collectief te verkrijgen wachtwoord). Vervolgens worden de beheer percelen gedeeltelijk doorkruist om de telling gedetailleerder te maken. Vooral bij hoog gras zorgt betreding voor een aanzienlijk hoger aantal waarnemingen dan van een afstand. Er worden geen nesten gezocht, alle notities zijn op basis van waargenomen gedrag.

Door de intensievere zoekmethode en daardoor vaak grotere aantallen vogels zijn de gegevens van deze BTS-telling vaak niet zo goed te vergelijken met de voor beleidsdoelen toegepaste BMP-tellingen.

De reden om voor de intensievere maar gedetailleerder BTS methode te kiezen, is het feit dat het hier om beheermonitoring gaat: naar aanleiding van de de telronden maken agrariërs vaak keuzen op het gebied van beheer. Nog even wachten met maaien of weiden omdat er vogels met nesten of jongen aanwezig zijn, of juist door met het beheer omdat er geen vogels in het land aanwezig waren? De tellers informeren de boeren als ze elkaar tegenkomen op het erf, maar DNatuur stuurt ook na iedere teldag een adviesmail met kaart naar het collectief.

Ook is met de BTS methode voor de grutto het Bruto Territoriaal Succes (BTS) te bepalen: hoeveel grutto's die gebroed hebben, brachten uiteindelijk ook jongen groot? De BTS tellingen zijn in 2026 uitgevoerd door ervaren tellers (Gijsbert Twigt en Arjan van Duijvenboden) in de laatste week van april (R1), laatste week mei (R2) en tweede week juni (R3).

In september heeft DNatuur met de gebiedscoordinatoren alle polders in detail doorgenomen.

DE VOGELS OP KAART

Om een beeld te krijgen van het broedseizoen, kijken we eerst naar locaties van vogels met een territorium (vogels die een nest of kuikens hebben of hiermee willen starten). In afb. 3-5 zijn de verschillende telgebieden te zien tijdens telronden R 1 (april), R2 (mei) en R3 (juni). Op deze kaarten zijn met rode vlekken de concentraties van territoria weergegeven van alle waargenomen vogels: hotspots. Wat ontstaat is vergelijkbaar met de systematiek van een buienradar: geen kleur: geen of zeer weinig vogels, lichte kleur: enkele vogels, donkerrode kleur: veel vogelterritoria dicht bij elkaar.





Afb. 3: hotspots (rood) van vogelterritoria en beheer (gekleurde percelen) in de vierde week van april (R1)



Afb. 4: hotspots (rood) van vogelterritoria en beheer (gekleurde percelen) in de vierde week van mei (R2)



Afb. 5: hotspots (rood) van vogelterritoria en beheer (gekleurde percelen) in de tweede week van juni (R3)


In het algemeen zien we dat in R1 de vogels zich vooral in beheerpercelen, maar ook in wit gebied vestigen. In R2 verdwijnen veel vogels uit wit gebied maar ook een aantal hotspots in Legselbeheer verdwijnen. Hier speelt bewerking en beweiding een rol. Verdwijnen van een hotspot geeft aan dat het beheermozaïek hier niet optimaal is.

Het wordt steeds duidelijker dat ook in juni (R3) nog een goed beheer mozaïek nodig is. Waar dit mozaïek geschikt blijft voor weidevogels, zien we ook in R3 een duidelijke rode hotspot. De plaatsen waar gedurende R1, 2 en 3 een hotspot te zien is, zijn waarschijnlijk de beste plaatsen voor weidevogels.

VOGELS IN AANTAL

In totaal zijn in 2026 bijna 3800 waarnemingen gedaan, verdeeld over de 3 telronden. Hoe deze waarnemingen zich verhouden tot eerdere tellingen, zullen we in 2027 bekijken, als het hele RGW gebied voor de vierde maal is geteld (1/3 per jaar).

Voor de Zuid-Hollandse doelsoorten 2026 is in afb. 6 te zien hoe het aantalsverloop was gedurende de drie telronden, met veel detail per polder in afb. 7. We zien daarbij dat de grutto, scholekster en tureluur tussen telronde R1 en R2 nauwelijks afnemen of zelfs toenemen in aantal. Dat indiceert dat de bescherming over het algemeen goed was. Na R2 dalen de meeste aantallen, maar niet naar nul. In afb. 7 is bijvoorbeeld te zien dat er in juni 2026 (R3) nog 114 grutto territoria waren, 99 kievit territoria en nog 104 tureluur territoria.



Afb. 6: Aantalsverloop territoria van doelsoorten per telronde in alle telgebieden samen.



	Groendijk			Hoog en Laageind			Hornpolder			Meijepolder			Polder De Wijk			Polder Middelburg Midden			Polder Middelburg Noord			Polder Middelburg Zuid			Venster Bodegraven			Venster Nieuwebrug			Venster tussen Wiericke			Zuideinderpolder		
Soort/Telronde	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
Bergeend		1	3	5	4	4	2	7	4	4	5		16	10	8	15	15	13	10	8	3				2			1			10	12	8			
Brandgans				2						3			2	1				1																	
Bruine kiekendief		1																											1							
Buizerd						2																							3	1						
Canadese gans				1	2	2				5	2		3	13	16	10	10	14	1		1									2			10	3	4
Fuut	2			6	8	6			1													1	2	3	1	1	2	1			2	4	2		
Gele kwikstaart						1					1	1		1																					
Grauwe gans				2			2						9	7	5	22			1			9			1		2	10	1	3	2				
Grutto	13	29	2	22	24	24	16	5	3	90	94	39	12	11	7	7	3	4	12	11	9	4			8	7	7	7			52	36	14			
Kievit	8	4	1	17	14	8	17	13	5	29	19	2	22	17	12	15	8	7	11	12	2	12	9	4	8	5	3	8	16	26	30	33	16			
Kleine plevier									1		1																									
Knobbelzwaan	6	4	2	3	4	5		1	1	1			1	1	1	1	2	2		1	1	1	2	1	1	3	4	5	5	3	15	13	6			
Kokmeeuw						1																				1										
Krakeend	9	3	5	19	10	1	4	3	2	15	2	1	7		6	13	5	4	5	3	1	2	1	2	7	6	2	8		2	46	21	10			
Kuifeend	2		3	2	6	7	3		2			2										1			2		1	1	1		5	6	4			
Kwartel						1																														
Nijlgans		1		2	5		1			4			5	6	2	9	8	6	7	3	1		1					3		1	7	5	3			
Ooievaar																										5	2									
Putter					1																															
Rietzanger					2																															
Scholekster	5	8	7	14	14	25	12	18	15	12	13	15	9	13	9	8	5	8	6	9	5	7	2	5	4	6	6	7	8	9	48	40	29			
Slobeend	6			2	2		5	1		7	3	2	1	2	1	2			2	1		1			2						13	4				
Tafeleend					3	3																					2									
Torenvalk																										1	1					1				
Tureluur	7	11	3	12	18	25	7	4	11	17	32	24	7	16	7	4	2	3	4	4		1	1		4	4	6	2			36	28	24			
Visdief	1				1								1			1																				
Waterhoen						1						1		2									2	2								1	1				
Wilde eend	7	5	3	9	11	10	4	1		4	2	6	9	6	5	21	11	7	14	3	4	9	11	4	9	10	7	14	8	3	115	64	27			
Wintertaling																2					1															
Zomertaling				1		1																									1					
Zwarte kraai	6			1	2	2	1																			3									
Zwarte stern																																24	20			
Totaal Resultaat	**72**	**67**	**29**	**120**	**131**	**129**	**74**	**53**	**45**	**191**	**174**	**93**	**104**	**106**	**79**	**130**	**69**	**69**	**73**	**55**	**28**	**48**	**31**	**21**	**49**	**55**	**47**	**69**	**39**	**47**	**392**	**295**	**168**			

Afb. 7: Aantallen territoria van soorten per telronde per gebied

Voor 2026 geldt: In de tweede week van juni (R3) was ongeveer 70% van de vogels (doelsoorten ZH) was nog niet klaar met het broedseizoen. Dat is een heel hoog percentage!


De spreiding van het broedseizoen is goed zichtbaar in de grafieken (bron: boerenlandvogelmonitor) die de verhouding tussen broedparen en gezinnen weergeven (afb. 8, 9, 10, 11).

Grutto (afb. 8): Naast het eerder genoemde slechts langzaam afnemende aantal territoria gedurende het broedseizoen valt ook het hoge aantal gezinnen op: een hoge BTS. Verder zien we in april al 51 grutto's met jongen, maar in juni ook nog 106 gezinnen! Dat betekent dat veel kuikenland tot eind juni nodig was.


Kievit (afb. 9): De kievit wordt wel als broedpaar gezien maar er lijken gedurende het hele seizoen maar zeer weinig gezinnen te zijn. Er lijkt dus iets mis te gaan in de nestfase of de eerste week van het kuiken. Misschien gebrek aan voedsel of dekking?

Scholekster (afb. 10): hoewel deze soort gedurende het hele broedseizoen stabiele aantallen laat zien, lijkt het aantal gezinnen in juni de piek te bereiken. Het is niet ondenkbaar dat de meeste scholeksters pas na telronde 3 de meeste kuikens hebben en dus ook behoefte hebben aan kuikenland.


Tureluur (afb. 11): De tureluur had in 2026 een matig jaar, maar ook een laat kuikenseizoen. Ook hier rijst de vraag: wat gebeurde er na R3 (juni)?




afb. 8: Aantal paren (oranje), waarvan gezinnen (blauw) per telronde grutto




afb. 9: Aantal paren (oranje), waarvan gezinnen (blauw) per telronde kievit



afb. 10: Aantal paren (oranje), waarvan gezinnen (blauw) per telronde scholekster



afb. 11: Aantal paren (oranje), waarvan gezinnen (blauw) per telronde tureluur



VEILIG THUIS VOOR DE GRUTTO

Het Bruto Territoriaal Succes is te bepalen voor de grutto en geeft weer welk percentage broedparen ook daadwerkelijk jongen groot bracht. Het is een maat voor het broedsucces van de grutto, waarbij 65% wordt gezien als een BTS waarbij de grutto populatie in een polder voldoende jongen groot brengt om voort te bestaan. Een BTS van meer dan 100% geeft aan dat er meer vogels met jongen zijn dan er gebroed hebben. Dat kan komen door instroom uit andere gebieden, maar ook doordat de broedende vogels niet zijn gezien: de grutto lijkt steeds schuwer te worden op het nest, mogelijk in reactie op predatie.

In afb. 12 (rij 1-11)vinden we heel veel cijfers die iets zeggen over de grutto en de gruttobiotoop in de telgebieden. 6 van de 12 telgebieden hebben een voldoende BTS grutto (rij 11), maar de meeste gebieden (10 van de 12) hebben onvoldoende kuikenland (rij 9, klassiek kuikenland op basis van zwaar beheer, en rij 10, kuikenland met last-minute beheer meegerekend). Dit komen we vaker in het werkgebied van RGW tegen: een voldoende broedsucces BTS, maar in theorie te weinig goed biotoop (1,4 ha/gezin).
Uitschieter van 2026 is daarbij polder De Wijk, waar zo veel grutto's broeden (90) dat het benodigde kuikenland meer oppervlak zou beslaan dan het telgebied. Dat betekent dat de gruttokuikens hier mogelijk te weinig voedsel hebben. Echter, 1,4 Ha benodigd kuikenland per broedpaar is een gemiddelde. Het is duidelijk dat in De Wijk de kwaliteit van het kuikenland zo hoog is dat er minder oppervlak voedselrijk gras nodig is om de kuikens toch te laten opgroeien.

De telgebieden van 2026 hebben samen een prima BTS van 87%. Toch is er -ook bij meerekenen van Last minute beheer- een tekort van bijna 40 ha. kuikenland.

Als we in afb. 12 naar gebieden zoeken waar grutto's echt veilig kunnen leven dan zien we dat alleen Hoog- en Laageind echt voldoende kuikenland had en ook een goede BTS. Als we Last-minute pakketten mee rekenen als kuikenland dan komt hier alleen Middelburg Noord bij. Echter, dit betekent niet 1 op 1 dat deze gebieden een goed mozaiek hebben en andere gebieden niet. Zo leven in Hoog- en Laageind 22 broedparen grutto in 535 ha, ruimte voor kuikenland is dus relatief makkelijk te vinden. In De Wijk leven 90 broedparen grutto op 94 Ha, de hele polder is dus al te klein om voldoende kuikenland te realiseren. Toch doen de grutto's het ook hier goed. Het benodigd kuikenland en ook de BTS zijn dus vooral uitgangspunten om een gesprek te beginnen i.p.v. een definitief 'rapportcijfer'.

	De Wijk	Groendijk	Hoog- en laageind	Hornpolder	Middelburg midden	Middelburg noord	Middelburg zuid	Midden polder oost	Venster Bodegraven	Venster Nieuwebrug	Venster tussen wiericke	Zuideinderpolder	Totaal Resultaat
opp telgebied	**94**	**139**	**535**	**110**	**79**	**96**	**82**	**33**	**142**	**103**	**160**	**666**	**2239,0**
nestbescherming	13,9	37,0	137,6	26,8	17,0	45,6	36,8	11,8	55,7	26,4	52,0	286,2	**746,9**
kuikenland klassiek	11,8	9,9	43,2	9,0	6,5	3,7	8,4	0,0	1,7	1,1	1,8	38,0	**135,3**
wit gebied	68,2	92,1	354,1	74,1	55,5	46,7	36,8	21,2	84,6	75,4	106,2	341,7	**1356,8**
plus op legsel	27,3	1,0	11,7	2,3	13,8	0,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	**89,5**
kuikenland incl last minute	39,1	10,9	54,9	11,3	20,3	4,1	12,5	0,0	1,7	1,1	1,8	66,9	**229,4**
broedparen grutto	90,0	13,0	22,0	15,0	12,0	7,0	12,0		5,0	9,0	7,0	53,0	**245,0**
gezinnen grutto	79,0	27,0	24,0	5,0	11,0	4,0	10,0		0,0	7,0	0,0	32,0	**199,0**
kuikenland nodig	126,0	18,2	30,8	21,0	16,8	9,8	16,8	0,0	7,0	12,6	9,8	74,2	**343,0**
Tekort of overschot kuikenland klassiek	-114,2	-8,3	12,4	-12,0	-10,3	-6,1	-8,4	0,0	-5,3	-11,5	-8,0	-36,2	**-207,7**
Tekort of overschot kuikenland incl Last minute	-86,9	-7,3	24,1	-9,7	3,5	-5,7	-4,3	0,0	-5,3	-11,5	-8,0	-7,3	**-118,2**
BTS grutto	88%	208%	109%	33%	92%	57%	83%	0%	0%	78%	0%	60%	**87%**

Afbeelding 12: Biotoopgegevens, broedsucces en biotoopwaarderingen RGW 2026



CONCLUSIE

2026 was in ongeveer de helft van de getelde gebieden een goed weidevogeljaar. De cijfers laten zien: vaak te weinig kuikenland, maar mogelijk in de 'goede' helft van de gebieden wel een goede biotoopkwaliteit.

De aantallen vogelterritoria tussen april en mei blijven vaak redelijk gelijk. Dat betekent dat de boeren in eventuele werkzaamheden goed rekening hielden met nesten. Toch is het aantal vogels met jongen (bij kievit en scholekster) soms laag.

De reden hiervoor kan liggen in het gebrek aan kuikenland ('zwaar beheer') in de polders. Mogelijk hebben boeren een voorkeur voor Last Minute beheer (uitgestelde maaidatum) op percelen met legselbeheer omdat ze dan flexibeler zijn in de bedrijfsvoering.

Maar dat is gevaarlijk voor de vogels: in 2026 leefde slechts 14% van grutto's in een polder die zowel voldoende kuikenland had als een voldoende BTS. 51% van de grutto's had een goede BTS maar onvoldoende kuikenland en 36 % van de grutto's had een lage BTS en ook te weinig kuikenland. Van 86 % van de "RGW-grutto's" is de toekomst dus onzeker. Gelukkig blijven de aantallen vogels over het algemeen stabiel in het werkgebied van RGW (zie ook de rapportage van 2024) en hebben veel leden van het collectief passie voor de weidevogels.
Het is nodig dat deze passie wordt omgezet in een echt veilig thuis voor de grutto en andere vogels door het afsluiten van meer kuikenland.

Er is dus -ondanks redelijke resultaten- nog veel winst voor de weidevogels te behalen met betere en grotere weidevogelmozaïeken.



ADVIES VAN DNATUUR

Er is meer kuikenland nodig in de meeste polders (afb. 12). Hier is echt een inhaalslag nodig om de gruttostand op termijn stabiel te houden of te laten groeien.

Het gaat slecht met de kievit en mogelijk de scholekster. Richt de aandacht daarom ook op maisland. Behandel dit als hotspot voor kievit en andere akker bewoners en bouw er een goed mozaïek omheen, met voldoende kuikenland. De kievit en de scholekster hebben mogelijk te weinig jongen (reproductie). Dat duidt erop dat er te weinig bescherming is op bouwland en mogelijk te weinig voedsel en veiligheid eromheen.

Sluit ook laat kuikenland af. 70% van de vogels had in juni nog een nest of jongen in de polders. Ook in 2025 betrof dit 30 %. Dat vraagt om kuikenland rond hotspots tot eind juni en rechtvaardigt monitoring in juni. Zonder voldoende kuikenland gaat deze laatste lichting kuikens grotendeels verloren.

Gebruik polder gesprekken ook in polders met veel wit gebied om de mozaïeken te vergroten.
In de polders, waar geen Veilig Thuis is voor de grutto, is meestal meer oppervlakte kuikenland nodig. Kijk met name rond de hotspots uit R1 (april) waar dit nodig is.

